

DABRAFENIB - TAFINLAR®

Qu'est-ce que TAFINLAR

Description de la molécule	Description
Dabrafenib	<p>Gélule de 50 ou 75 mg : marron</p> 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.



Dans votre cas, elle est de..... mg par jour, soit gélule(s) de 50 mg et gélule(s) de 75 mg par prise, à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir ou dissoudre les gélules.

A prendre à heure fixe, à distance des repas (1h avant ou 2h après le repas)

En cas d'oubli : Prendre la dose si retard

Posologie - Mode d'administration

2 prises par jour, à heure fixe, en dehors des repas	
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (Prise de sang permettant de surveiller vos fonctions rénales et hépatiques) et clinique (examens dermatologiques, électro-cardiogramme, scintigraphie cardiaque) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre TAFINLAR® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de jus de pamplemousse avec le TAFINLAR®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	Troubles cutanés : tumeurs (bénigne ou maligne), éruption, épaissement de la peau, sécheresse, démangeaisons, rougeurs, inflammation de la paume des mains, de la plante des pieds et des zones de frottement Troubles digestifs : nausées, diarrhées, constipation, perte de l'appétit Troubles au niveau des yeux : inflammation Troubles au niveau cardiaque Troubles au niveau des muscles : douleurs Autres : maux de tête, fatigue, fièvre, syndrome grippal, toux
Certains patients nécessitent une attention particulière	Patients diabétiques (risque d'hyperglycémie)
Quand alerter l'équipe médicale ?	



<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p>Troubles cutanés</p> <ul style="list-style-type: none"> > Apparition de verrues > Peau douloureuse ou bosse rougeâtre sur la peau accompagnée de saignements ou ne cicatrisant pas > Changement de taille ou de couleur d'un grain de beauté > Apparition de cloques importantes ou un décollement sévère de la peau <p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour > Douleur intense dans le ventre > Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. > Moins de 3 selles par semaine <p>Douleurs empêchant vos activités habituelles</p> <ul style="list-style-type: none"> > Maux de tête > Douleurs ou inflammation aux mains et aux pieds > Douleurs inhabituelles et inexplicables dans les muscles <p>Troubles au niveau des yeux</p> <ul style="list-style-type: none"> > Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière <p>Symptômes évocateurs d'une hypertension</p> <ul style="list-style-type: none"> > Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges > Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension <p>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</p> <ul style="list-style-type: none"> > Sang dans les selles, ou en cas de vomissements > Hématomes (bleus), saignements de nez <p>Symptômes évocateurs d'une phlébite</p> <ul style="list-style-type: none"> > Mollet rouge, chaud et douloureux <p>Troubles au niveau des poumons</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire
---	--

Comment prévenir les effets indésirables?

Soins de la peau	<p>Sur vos mains et vos pieds : Appliquez une crème ou un lait hydratant et/ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds (sans frotter vigoureusement).</p> <p>Évitez d'exposer vos mains et vos pieds à la chaleur (eau chaude). Évitez les activités qui génèrent des frottements ou des plaies et le port de vêtements, chaussettes et chaussures trop serrées</p> <p>Corps : Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p>Évitez toute utilisation de produits irritants.</p>
Protection solaire	<p>INDISPENSABLE. Utilisez un écran total (indice 50) et évitez les expositions.</p> <p>Privilégiez des vêtements couvrants : à manches longues et à col, les pantalons longs et les chapeaux.</p>
Chute de cheveux	<p>Faites couper vos cheveux. Informez-vous sur les perruques et leur remboursement.</p> <p>Utilisez un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité. Privilégiez une brosse souple.</p> <p>Évitez de laver vos cheveux trop fréquemment. Évitez les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes.</p>
Poids	<p>Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs</p>



Fatigue	Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.
Saignements	En association avec trametinib - MEKINIST® Évitez la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...) Informez votre médecin: > si vous consommez des <i>anticoagulants</i> ou des <i>anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose > en cas d' <i>intervention chirurgicale ou dentaire</i>
Infection	Évitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera
Constipation	<i>Pour stimuler le transit, pratiquez</i> une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...
Suivi de la tension	En association avec trametinib - MEKINIST® Une tension élevée doit être corrigée. Une mesure de la tension artérielle est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Comment adapter son alimentation ?	
Diarrhées	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Évitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés
Perte de poids	Privilégiez une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »
Constipation	Privilégiez une alimentation enrichie en fibres. Buvez de l'eau de façon abondante.

