



## VANDETANIB - CAPRELSA®

### Qu'est-ce que CAPRELSA

Description de la molécule	Description
Vandetanib	<p>Comprimé de 100 mg : blanc, rond Comprimé de 300 mg : blanc, ovale</p> 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.





Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... comprimé(s) de ..... mg, à prendre une fois par par jours, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser ou couper les comprimés. Les comprimés peuvent être dispersés en remuant 10 minutes dans un demi verre d'eau non gazeuse. BOIRE immédiatement. RINCER le verre et BOIRE l'eau de rinçage.

A prendre A heure fixe. Au moment ou en dehors du repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas	  
En continu	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller vos fonctions thyroïdienne et hépatique et votre ionogramme.) et clinique (électrocardiogramme) .

## Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.

## Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre CAPRELSA® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis, pamplemousse, Boldo, Fucus, Ginseng asiatique, Orange de Séville, Passiflore, Pissenlit, Ginkgo Biloba, Petit Houx, Réglisse, Yohimbe avec le CAPRELSA®

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : diarrhées, nausées, perte d'appétit, vomissements, remontées acides</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : éruptions cutanées, sensibilité au soleil, acné, démangeaisons, sécheresse, anomalies des ongles</p> <p><b>Douleurs</b> : fatigue, maux de tête, douleurs</p> <p><b>Infections</b> : pharyngite, sinusite, rhinite, infection urinaire, etc</p> <p><b>Généraux</b> : troubles du sommeil, fatigue, troubles de l'humeur, œdèmes</p> <p><b>Troubles au niveau des yeux</b> : vision trouble</p> <p><b>Trouble de la fonction cardiaque</b> dont hypertension</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hypertension</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges</li> <li>• Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension</li> </ul> <p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>• Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>• Douleur intense dans le ventre</li> <li>• Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sang dans les selles, ou en cas de vomissements</li> <li>• Hématomes (bleus), saignements de nez</li> </ul> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</li> </ul> <p><b>Troubles cutanés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apparition de cloques importantes ou un décollement sévère de la peau</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'un œdème cérébral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maux de tête, confusion, convulsions ou</li> <li>• Troubles de la vision</li> </ul>



**Comment prévenir les effets indésirables?**

Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. <b>Une mesure de la tension artérielle est recommandée</b> régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Poids	<b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs ou d'œdèmes (gonflement des membres)
Soins de la peau	<u>Sur vos mains et vos pieds</u> : <b>Appliquez</b> une crème ou un lait hydratant et/ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds (sans frotter vigoureusement). <b>Évitez</b> d'exposer vos mains et vos pieds à la chaleur (eau chaude). <b>Évitez</b> les activités qui génèrent des frottements ou des plaies et le port de vêtements, chaussettes et chaussures trop serrées <u>Corps</u> : <b>Privilégiez</b> pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. <b>Évitez</b> toute utilisation de produits irritants.
Protection solaire	<b>INDISPENSABLE. Utilisez</b> un écran total et évitez les expositions (indice 50). <b>Privilégiez</b> des vêtements couvrants : à manches longues et à col, les pantalons longs et les chapeaux.
Ongles	<b>Évitez</b> les traumatismes de vos ongles des mains et des pieds. <b>Évitez</b> les vernis sauf si c'est un vernis (protecteur) qui vous a été conseillé spécifiquement par l'équipe soignante. <b>Privilégiez</b> une coupe des ongles droits et pas trop courts.
Saignements / hémorragies	<b>Évitez</b> la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...) <b>Informez</b> votre médecin: > si vous consommez des <i>anticoagulants</i> ou des <i>anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose > en cas d' <i>intervention chirurgicale ou dentaire</i>
Infection	Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera
Œdèmes	<b>Évitez</b> les vêtements, chaussettes et chaussures trop serrés, <b>Surélevez</b> vos pieds. <b>Surveillez</b> régulièrement votre poids.
Fatigue	<b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... <b>Alternez</b> période d'activité et de repos.

**Comment adapter son alimentation?**

Diarrhées	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes. <b>Évitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante
Nausées	<b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés



Remontées acides	<b>Evitez</b> certains facteurs de risques : alcool, tabac, café, repas copieux et gras. <b>Privilégiez</b> une alimentation fractionnée
Perte d'appétit	<b>Privilégiez</b> une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »



ONCOLIEN de [SFPO](https://oncolien.sfpo.com) est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>